

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 13.

FIZIKA

**EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI
ÉRETTSÉGI VIZSGA**

**JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓ**

**OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTERIUM**

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgának folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejt ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dölt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dölt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dölt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

- 1. B**
- 2. A**
- 3. D**
- 4. B**
- 5. A**
- 6. B**
- 7. A**
- 8. C**
- 9. C**
- 10. C**
- 11. B**
- 12. B**
- 13. C**
- 14. B**
- 15. A**

Helyes válaszonként **2 pont**.

Összesen

30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. téma

- a) *A fény mint elektromágneses hullám és tulajdonságai:*

1 + 1 + 1 pont

A fényt váltakozó elektromos és mágneses mező alkotja.

A fény transzverzális hullám, vákuumbeli sebessége ~300 000 km/s.

(Ha a vizsgázó azt írja, hogy a fény sebessége légiörös térben állandó, de nem adja meg ezt a sebesség értékét, a pont megadható. Ha a sebesség helyett a frekvenciát vagy a hullámhosszat emeli ki a vizsgázó, az 1 pont megadható.)

- b) *A vákuumbeli terjedés magyarázata:*

1 + 1 + 1 pont

Az időben változó elektromos tér mágneses teret kelt, az időben változó mágneses tér elektromos teret kelt a közegtől függetlenül.

- c) *A síkbeli (lineáris) polarizáció lényegének leírása:*

1 pont

A síkban polarizált hullámban a rezgés egy meghatározott síkban zajlik terjedése során. Két megfelelő helyzetű polarizátorral a teljes hullám kioltható.

(Más megfogalmazás is elfogadható, pl. megfelelő szűrővel a terjedési irányra merőleges meghatározott rezgési síkú hullámok kiválaszthatók.)

Annak felismerése, hogy a polarizálhatóság a fény transzverzális tulajdonságát bizonyítja:

1 pont

- d) *Az interferencia jelenségének magyarázata:*

A tér adott pontjában találkozó hullámok pillanatnyi „kitérései” összeadódnak.

1 pont

Az interferenciakép időbeli állandóságának feltétele az állandó fáziskülönbség a hullámtér pontjaiban.

1 pont

Az időben állandó fáziskülönbség mértékét a hullámtér egy adott pontjában az útkülönbség (a hullámforrásoktól vett távolságok különbsége) határozza meg.

1 pont

(A hullámok forrásbeli koherenciáját /együtt-változását/ nem szükséges a vizsgázónak külön említenie, ezt a második megállapításba beleérthetjük mint feltételet.)

e) Az optikai rács és a rácson való elhajlás értelmező leírása:

**4 pont
(bontható)**

(Levezetésnek nem kell szerepelnie, de a következő négy elemnek kell logikus egységet alkotnia.)

a rácsállandó: két szomszédos rés távolsága
a rácsállandó és az adott irányban lévő képernyőpont meghatározza, hogy mekkora útkülönbséggel érkezik az adott pontba két szomszédos fénysugár,
az útkülönbség és a hullámhossz meghatározza a fáziseltolódást (elég az erősítési és gyengítési pontokra megfogalmazni, a szöveg helyett az indoklásba világosan illeszkedő képletek is elfogadhatók),
a fény színét a frekvenciája határozza meg.

f) A hullámhossz mérési eljárásának leírása:

1+1+1 pont

A mérési elrendezés leírása (fényforrás, rács, ernyő)
(Egyértelmű rajz is helyettesítheti a leírást.)

Leolvasott és mért értékek: rácsállandó leolvasása, rács-ernyő távolság és az első két erősítési pont távolságának mérése.

A hullámhosszt meghatározó összefüggés felírása hullámhosszra rendezve (elég a kis szögre vonatkozó egyszerűsített képlet).

Összesen 18 pont

2. téma

- a) *A Galilei-féle relativitási elv:*

4 pont

Az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszerekben a mechanika törvényei azonosak.

vagy:

Inerciarendszernek nevezzük azt a vonatkoztatási rendszert, melyben Newton törvényei érvényesek. Egy inerciarendszerhez képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszer is inerciarendszer.

- b) *A megfigyelők relatív mozgásának hatása a fény tapasztalt sebességére:*

3 pont

(A 3 pont akkor adható meg, ha a jelölt egyértelművé teszi, hogy a fény sebességét az egymáshoz képest mozgó megfigyelők, relatív sebességüktől függetlenül azonosnak tapasztalják, mérik.)

- c) *Összhang az Einstein-féle relativitás elvvel:*

4 pont

Mivel az Einstein által kiterjesztett relativitási elv értelmében az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző megfigyelők vonatkoztatási rendszereiben a fizikai állandók azonosak, ezért a fénysebességnak a megfigyelő mozgásától független volta a kiterjesztett relativitási elvből következik.

- d) *A légiures térben mért fénysebesség határsebesség jellege:*

2 pont

A légiures térben mérhető fénysebességet nem lehet átlépni.

(Ha a vizsgázó nem említi, hogy a légiures térben mért fénysebesség a határsebesség, akkor maximum 1 pont adható.)

- e) *Állandó erővel gyorsított test sebességére vonatkozó megállapítás megfogalmazása:*

Egy állandó erővel gyorsított test sebessége a test sebességének növekedésével egyre kisebb mértékben nő. A test sebessége a légiures térben mért fénysebességhöz közelít, de azt nem érheti el.

(Ha a vizsgázó nem említi, hogy a légiures térben mért fénysebesség a határsebesség, csak egyszer vonható le 1 pont.)

2 pont

- f) *A sebességnövekedés lassulásának értelmezése:*

3 pont

A sebesség növekedésével a test tömege is nő, ezért a test egyre nehezebben gyorsítható.

vagy:

Az állandó erő okozta lendületváltozás a sebesség növekedésével egyre kisebb sebességváltozást jelent.

Összesen**18 pont**

3. témaa) *A Hold felszínének jellemzése:***2 pont
(bontható)**

A Holdat kráterek borítják, völgyek, hegyek, kiterjedt mélyedések szabdalják.
Anyaga a földiéhez hasonló kőzet.

b) *A Hold felszínén mérhető, a földitől eltérő gravitációs gyorsulás okai:*

Annak felismerése, hogy a Hold tömege kisebb, mint a Föld tömege, a tömeggel arányosan csökken a felszínen mérhető gravitációs gyorsulás:

1 pont

Annak felismerése, hogy a Hold sugara kisebb, mint a Föld sugara, a sugár csökkenésével fordított arányban, négyzetesen nő a felszínen mérhető gravitációs gyorsulás:

**2 pont
(bontható)**

Annak felismerése, hogy a két tényező együttes hatására a földinél kisebb gravitációs gyorsulás jön létre a Hold felszínén:

1 pont

(Az arányok pontos kifejezésére nincs szükség.)

c) *Példa megadása az eltérés következményeire:***1 pont**

Pl. Bármilyen mozgás leírása a Holdon, vagy a holdi légkör hiánya stb.

d) *A Hold kráterborítottságának magyarázata:***2 pont
(bontható)**

A krátereket meteorok hozzák létre (elsődlegesen becsapódási kráterek). Mivel nincs a Holdnak légköre, ezek nem tudnak elégni, mint a Föld légkörében a Földet megközelítő meteorok.

e) *A holdfázisok keletkezésének, periódusának leírása, magyarázata, rajz készítése:*

A holdfázisok keletkezésének, periódusának leírása, magyarázata:

**3 pont
(bontható)**

rajz készítése:

**2 pont
(bontható)**f) *A teljes nap- és holdfogyatkozás rajzos értelmezése:*

a napfogyatkozás rajzos értelmezése:

2 pont

(Ha az egész Föld holdárnyékban van a rajzon, akkor 1 pont adandó.)

a holdfogyatkozás rajzos értelmezése:

2 pont

(Ha nincs az egész Hold földárnyékban a rajzon, de az elrendezés helyes, akkor 1 pont adandó.)

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése minden téma vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség:

0-1-2 pont

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egész:

0-1-2-3 pont

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefügggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó téma választása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $m_f = 2 \text{ kg}$, $t_f = 70^\circ\text{C}$, $m_v = 2,5 \text{ kg}$, $t_v = t_e = 22^\circ\text{C}$, $t_k = 28^\circ\text{C}$, $c_{\text{víz}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$,

$$C_{\text{edény}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

Az energiamérleg megfogalmazása:

3 pont

A fém által leadott hót a víz és az edény veszi fel.

$$\text{vagy } Q_{\text{fém}} + Q_{\text{víz}} + Q_{\text{edény}} = 0,$$

$$\text{vagy } |Q_{\text{fém}}| = |Q_{\text{víz}}| + |Q_{\text{edény}}|.$$

(A $Q_{\text{fém}} = Q_{\text{víz}} + Q_{\text{edény}}$ csak abban az esetben fogadható el, ha a későbbiekben egyértelműen kiderül a tartalmilag helyes előjelértelmezés.)

A hőmennyiségek kifejezése, egyenletbe helyettesítése:

$$|Q_{\text{fém}}| = c_f \cdot m_f \cdot (t_f - t_k)$$

1 pont

$$|Q_{\text{víz}}| = c_v \cdot m_v \cdot (t_k - t_v)$$

1 pont

$$|Q_{\text{edény}}| = C_e \cdot (t_k - t_v)$$

1 pont

$$c_f \cdot m_f \cdot (t_f - t_k) = c_v \cdot m_v \cdot (t_k - t_v) + C_e \cdot (t_k - t_v)$$

1 pont

(A hőmennyiségek abszolút értékeinek vagy előjeles értékeinek kifejezése, illetve az egyenletbe történő behelyettesítése a vizsgázó által választott módtól függ. Ha például

$$Q_{\text{fém}} + Q_{\text{víz}} + Q_{\text{edény}} = 0$$

volt a választott alak, akkor a logikus folytatás
 $c_{\text{fém}} \cdot m_f \cdot \Delta t_f + c_{\text{víz}} \cdot m_v \cdot \Delta t_v + C_{\text{edény}} \cdot \Delta t_e = 0$. Ebben a lépésben tehát a helyes előjelhasználatot értékeljük alapvetően.)

rendezés, számítás:

3 pont
(bontható)

$$c_{\text{fém}} = 900 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

(Ha a végeredmény mértékegysége hibás vagy hiányzik, akkor max. 2 pont adható.)

Összesen: 10 pont

2. feladat

Adatok: $D = 25 \frac{\text{N}}{\text{m}}$, $m = 0,02 \text{ kg}$, $h = 1,25 \text{ m}$, $\Delta l = 40 \text{ cm}$

- a) A csúzli kihúzásához szükséges erő meghatározása:

$$F = 2 \cdot D \cdot \Delta l = 20 \text{ N}$$

1+1 pont

- b) A mechanikai energia megmaradásának alkalmazása a kő kilövésére:

3 pont

$$\frac{1}{2}m \cdot v^2 = 2 \cdot \frac{1}{2}D \cdot \Delta l^2.$$

(Ha a vizsgázó csak egyetlen gumiszálra vonatkoztatva írja föl a rugalmas erő munkáját – a rugalmas energia változását –, akkor 2 pont adandó!)

A kő sebességének meghatározása (rendezés és számítás) :

1 + 1 pont

$$v = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- c) A mozgás időtartamának meghatározása:

1 + 1 pont

$$h = \frac{g}{2} t^2, \text{ amiből } t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} = 0,5 \text{ s az esési idő.}$$

A vízszintes távolság felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

A vízszintes mozgás ideje megegyezik az esés idejével

$$s = v \cdot t = 10 \text{ m}$$

(A szöveges magyarázat nem szükséges, ha a vizsgázó eleve a mozgás idejéről beszél, vagy a megoldásból ez nyilvánvalóan kiderül.)

Összesen: 11 pont

3. feladat

Adatok: $v = 1000 \text{ m/s}$, $q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

a) *A protonok pályájának értelmezése:*

A mágneses mezőben a töltések körpályán mozognak,
a D_1 detektor eléréséhez egy félkört kell megtenni, ezért $R_p = 0,5 \text{ m}$.

1 + 1 pont

(Megfelelő rajz is elfogadható.)

A mágneses indukció nagyságának kiszámítása:

$$m_p \frac{v^2}{R_p} = q_p \cdot v \cdot B,$$

2 pont

$$\text{tehát } B = \frac{m_p}{q_p} \cdot \frac{v}{R_p} = 2,1 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

1 + 1 pont

b) *A D_2 detektort elérő részecskefajták azonosítása:*

A D_2 detektor eléréséhez egy negyed kört kell megtenni, az azt elérő részecskék pályasugara tehát $R_2 = 1 \text{ m}$.

1 + 1 pont

(Megfelelő rajz is elfogadható.)

Mivel $R \sim \frac{m}{q}$, ezért a keresett részecskékre $\frac{m}{q} = 2 \cdot \frac{m_p}{q_p}$, azaz a keresett részecskék fajlagos töltése a protonénak a fele.

**2 pont
(bontható)**

(Ha a vizsgázó arányosság helyett újraszámolással határozza meg a fajlagos töltést vagy a reciprokát, akkor is jár a megfelelő pontszám.)

Az egyik lehetőség a deutérium atommag (deuteron) (${}_1^2H$),

1 pont

a másik pedig az alfa-részecske (${}_2^4He$).

1 pont

c) *A neutrondetektor elhelyezésének megadása és indoklása:*

A neutronokat a mágneses tér nem tériti el,

1 pont

tehát a detektort pontosan a beérkező nyalábbal szemben kell elhelyezni.

1 pont

Összesen: 14 pont

4. feladat

a) A kilépési munka meghatározása a fényelektromos jelenség alapegyenletéből:

$$E_{kin} + W_{ki} = h \cdot f$$

2 pont

A számítások elvégzése:

$$W_{ki} = 6,95 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

2 pont

(bontható)

b) A határfrekvencia mennyiségi értelmezése:

2 pont

$$E_{kin} = 0, \text{ ezért } h \cdot f_h = W_{ki}$$

A határfrekvencia kiszámítása:

2 pont

(bontható)

$$f_h = 1,05 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

c) A kétszeres sebességhoz tartozó mozgási energia meghatározása:

2 pont

Ha az elektronok sebessége kétszerese a korábbinak, mozgási energiájuk négyeszerére nő.

$$E = 12 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

A keresett frekvencia meghatározása:

2 pont

(bontható)

$$h \cdot f = E_{kin} + W_{ki} \Rightarrow f = \frac{12 \cdot 10^{-19} \text{ J} + 6,95 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}} = 2,86 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

Összesen: 12 pont